

# افتادن مواد پرکردنی دندان به چه علت است؟

زمان افتادن مواد پرکردنی دندان ها چه کنیم؟ پر کردن دندان با استفاده از ماده آمالگام و یا **کامپوزیت** انجام می شود. اگر چه در زمان پر کردن **دندانپزشک زیبایی** سعی می کند تا دندان را به نحو احسن پر کند و در عین حال توصیه های زیادی می شود تا از دندانهای پر شده مراقبت شود و از شکستن تنقلات سفت بر روی آنها خودداری شود، اما گاهی ممکن است ماده پرشدگی به دلایل مختلف از دندان جدا شود. یکی از دلایل جدا شدن ماده پرشدگی دندان، پوسیدگی است. در نتیجه پس از مدتی ماده آمالگام یا کامپوزیت شل می شود. شل شدن پرشدگی دندان حالت ناخوشایندی دارد. بویژه اگر در زمان غذا خوردن این اتفاق رخ دهد، حس بدی را در افراد ایجاد می کند.

جهت استفاده از خدمات **بیمه دندانپزشکی** با مشاورین مهراز کارت تماس حاصل نمائید.

## تاثیر جدا شدن پرشدگی دندان

اگر پرشدگی دندان جدا شود تاثیرات نامطلوبی را به دنبال دارد که عبارتند از:

- کنده شدن ماده پرکننده از دندان و در نتیجه خالی ماندن آن
- امکان نفوذ مواد غذایی و آب در لایه لای دندان و در نتیجه احتمال خطر عفونت
- تخریب دندان و سخت شدن درمان آن
- **حساس شدن دندان به گرما و سرما** و در نتیجه شدت گرفتن درد دندان

### پر کردن دندان با جدیدترین روش ها با مهراز کارت

با وجود همه این موارد، درمان دندان غیرممکن نیست و با مراجعه به موقع به دندانپزشک می توان دندان را ترمیم کرد. اگر ماده پرکننده اینله یا طلا باشد، دندانپزشک آن را براحتی در جای اصلی قرار می دهد. در مواردی که ماده پرشدگی چند بار از روی دندان جدا می شود، می توان از یک روش پیشگیری استفاده کرد. با روکش کردن دندانی که پر شده است، براحتی می توان از این مشکل جلوگیری کرد.

## نکاتی در مورد جدا شدن پرشدگی دندان

اما زمانی که ماده پرکننده دندان جدا شد، باید نکات زیر را مد نظر قرار داد:

### • خارج کردن ماده پرکننده از دهان

ابتدا باید ماده پرکننده را از دهان خارج کنید تا از بلعیدن و استنشاق آن جلوگیری شود. اگر ماده آمالگام باشد که حاوی جیوه است، بلعیدن این ماده موجب آسیب جدی به بدن می شود که مشکلات تنفسی و عفونت را به دنبال دارد. اگر ماده از طلا یا **اینله و اوئله** باشد، می تواند مجدد استفاده شود.

برای دیدن **تعرفه دندانپزشکی** اینجا کلیک کنید.

### • رعایت بهداشت دهان قبل از مراجعه به دندانپزشک

قبل از اینکه به دندانپزشک مراجعه کنید، ابتدا باید دهان را به خوبی بشویید. مسواک بزنید و دندانی که ماده پرشدگی از آن جدا شده است را به خوبی تمیز کنید تا ذرات مواد غذایی از آن خارج شود. بهتر است دهان را با آب و نمک شستشو دهید تا خطر عفونت را به حداقل برسانید.

### • مراقبت از حساسیت دندان

پس از اینکه ماده پرشدگی از دندان جدا شد، دندان را به شدت حساس می کند. در این صورت ممکن است توبولهای عاج (مسیرهای ریز ارتباط بین عاج و پالپ دندان) در دندان رخنه کنند. توبول های عاج از داخل دهان به **پالپ دندان** یک مسیر مستقیم ایجاد می کنند. عصبهای دندان تمام حس خود را به مغز ارسال می کنند. بنابراین هرگونه احساس گرما و سرما از طریق توبولهای عاج سریع تر به مغز می رسد. در این صورت ممکن است درد دندان شروع شود. برای تسکین درد می توان از داروهای مسکن همچون اسپیرین، تیلنول و ادویل (ایبوپروفن) استفاده کرد.

همه چیز درباره **روکش دندان** را بدانید...

## • تسکین درد دندان

اگر درد دندان بیش از حد شود، می توان از روش پوشاندن دندان استفاده کرد. در این صورت با مواد موقت بر روی سوراخ دندان باید توبولها را پوشاند. آدامس گزینه مناسبی برای پرکردن موقت دندان است. برخی مواد پرکننده موقت در داروخانه موجود است که حاوی اکسید روی هستند. تا زمانی که دندان به طور کامل درمان نشده است، بهتر است از این مواد استفاده شود.

جهت تهیه **بیمه دندانیشکی** با ما همراه باشید.

جهت تهیه بهترین **بیمه دندانیشکی** با مشاورین مهراز کارت همراه شوید.

منابع: الهام گرفته از مجموعه مقالات بین المللی ISI درباره **پر کردن دندان**

