

# جراحی دندان کودکان

ممکن است دندانپزشک به دلیل وجود برخی مشکلات در بخش دهان و دندان تشخیص دهد که فرزند شما برای درمان به جراحی دندان کودکان نیاز دارد. به طور کلی جراحی واژه ترسناکی است که باعث ترس والدین می‌گردد. ما در این مقاله، به بررسی معضلات و مشکلات جراحی دندان اطفال، نحوه تشخیص نیاز به جراحی، روش‌های جدید جراحی دندان اطفال با بیهوشی، و مراقبت‌های پس از جراحی خواهیم پرداخت.

## جراحی دندان

عموماً منظور از جراحی دندان اطفال موارد زیر می‌باشد:

۱. جراحی دندان‌های شیری: برای درمان مشکلاتی مانند پوسیدگی شدید، عفونت، آبسه و تروما به دندان‌های شیری کودکان انجام می‌شود.
۲. کشیدن دندان: دندان‌های شیری که افتادن آن‌ها به تاخیر افتاده یا نمی‌افتند، ممکن است نیاز به کشیده شدن داشته باشند.
۳. درمان ارتودنسی: درمان‌های ارتودنسی زودهنگام برای اصلاح مشکلات همچون شکاف لب و کام، دندان‌های شلوغ و نامنظم انجام می‌شود.
۴. جراحی‌های لثه: شامل درمان بیماری‌های لثه در کودکان.
۵. جراحی دندان‌های اضافی: دندان‌های نهفته یا دندان‌های اضافی ممکن است نیاز به جراحی داشته باشند.
۶. ترمیم‌های دندان: ترمیم حفره‌های ناشی از پوسیدگی در دندان‌های دائمی کودکان.

با تهیه [بیمه دندانپزشکی](#) می‌توانید [تर्फه دندانپزشکی](#) درمانی و زیبایی خود را تا ۵۰٪ کاهش دهید...

## مشکلات جراحی دندان

جراحی دندان در کودکان نیز همچون بزرگسالان با معضلات و چالش‌های خاصی روبه‌رو است از مهم‌ترین مشکلات این جراحی می‌توان ترس و اضطراب کودک از جراحی و درد حین آن، همکاری نکردن کودک حین جراحی به دلیل سن پایین، خطر بیهوشی عمومی در کودکان خردسال، احتمال آسیب به دندان‌ها و لثه‌های در حال رشد، خطر آسیب به اعصاب و رگ‌های خونی نزدیک به محل جراحی، درد و ناراحتی پس از عمل جراحی، مشکل در خوردن و جویدن غذا، نیاز به مراقبت‌های ویژه و دقیق پس از جراحی و هزینه‌های بالای جراحی دندان کودکان را نام برد.

[کشیدن ریشه دندان پوسیده چگونه انجام میشود؟](#)

## تشخیص نیاز به جراحی دندان

برای تشخیص نیاز کودک به جراحی دندان، معمولاً معاینه دهان و دندان‌ها توسط دندانپزشک کودکان و رادیوگرافی پانورامیک یا سایر عکس‌های رادیولوژیک برای بررسی وضعیت دندان‌ها و فک انجام می‌گیرد. متخصص تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی کودک و رشد و تکامل صحیح فک و دندان‌ها بررسی کرده و با معاینه مشکلاتی مانند پوسیدگی شدید، نیاز به ارتودنسی، التهاب لثه، دندان نهفته یا اضافی، ناهنجاری‌های فکی و... را تشخیص می‌دهد.

## جراحی دندانها با بیهوشی

امروزه بسیاری از جراحی‌های دندان اطفال با بیهوشی عمومی انجام می‌گیرد. بیهوشی عمومی باعث می‌شود کودک هیچ دردی را احساس نکرده و از جراحی آگاه نباشد. این روش مناسب کودکانی است که همکاری کمتری دارند یا جراحی پیچیده‌ای لازم دارند. البته بیهوشی عمومی در کودکان خطرناک‌تری دارد و باید توسط متخصص بیهوشی انجام شود. پس از عمل نیز کودک تحت نظر قرار می‌گیرد تا اثرات جانبی بیهوشی کنترل شود.

[جراحی دندان عقل فک پایین](#) توسط متخصصین مهر از کارت

## تکنیک‌های جدید جراحی دندان

پیشرفت‌های اخیر در جراحی دندان کودکان باعث شده روش‌های کم‌تهاجم‌تر و دقیق‌تری ابداع شود. استفاده از لیزر برای جراحی‌های نرم‌بافتی، تکنیک‌های پیشرفته در کشیدن دندان، ابزارهای دقیق جراحی، روش‌های نوین درمان ریشه و ارتودنسی زودهنگام از جمله این تکنیک‌ها هستند. این روش‌ها باعث کاهش درد و ناراحتی کودک، بهبود نتایج درمان و تسریع در بهبودی می‌شوند.

روش‌های [کشیدن دندان شکسته در منزل](#) چیست؟

## عوارض جراحی دندان

عوارض احتمالی جراحی دندان در کودکان عبارتند از:

۱. خون‌ریزی: ممکن است پس از جراحی به مدت چند روز خون‌ریزی خفیفی از محل جراحی باشد.
۲. عفونت: اگر بهداشت دهانی رعایت نشود، ممکن است محل جراحی عفونت کند.
۳. آسیب به دندان‌های دیگر: در طول عمل جراحی احتمال آسیب به دندان‌ها یا مناطق اطراف وجود دارد.
۴. آسیب به اعصاب: ممکن است در طی جراحی، اعصاب آسیب ببینند که باعث ایجاد درد یا بی‌حسی می‌شود.
۵. واکنش به بیهوشی: تهوع، استفراغ، سرگیجه از عوارض بیهوشی عمومی است.
۶. عوارض دارویی: واکنش‌های آلرژیک، تداخل دارویی و ...
۷. عفونت یا آسیب به مغز و استخوان فک: در جراحی‌های پیچیده‌تر
۸. صدمه به بافت‌های نرم دهان

بنابراین انتخاب جراح ماهر و رعایت مراقبت‌های پس از عمل ضروری است.

[هزینه کشیدن دندان با جراحی چگونه است؟](#)

## مراقبت‌های پس از جراحی دندان

در این بخش مهم‌ترین اصول مراقبتی پس از درمان دندان کودکان برای کاهش عوارض احتمالی ذکر شده و لازم است که شما به عنوان والدین کودک این موارد را رعایت کنید. از مراقبت‌های پس از جراحی دندان اطفال می‌توان مصرف داروهای ضد درد براساس تجویز پزشک، استفاده از گاز استریل برای فشار آوردن روی محل جراحی، مسواک زدن ملایم محل جراحی با توصیه پزشک، اجتناب از مصرف غذاهای سخت، چسبنده یا داغ در روزهای اول، ویزیت مجدد توسط دندانپزشک جهت بررسی روند بهبودی، مصرف داروهای تجویز شده توسط پزشک به موقع، اجتناب از فعالیت‌های خسته‌کننده در روزهای اول، جلوگیری از لمس محل جراحی توسط کودک و آموزش بهداشت دهان و دندان به کودک پس از بهبودی را نام برد.

مطالعه درباره [جراحی کشیدن دندان](#) با بیمه دندانپزشکی

## جراحی دندان نهفته چگونه انجام میشود؟

### **خلاصه مطلب**

با توجه به مطالب ارائه شده جراحی دندان اطفال می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، اما با برنامه‌ریزی دقیق، ارتباطات موثر با کودک و خانواده، و استفاده از تکنیک‌های جدید و ایمن، می‌تواند به بهبود سلامت دهان و دندان کودکان و افزایش اعتماد به نفس آنها در مورد مراقبت از دندان‌های خود منجر شود.

منابع: الهام گرفته از مجموعه مقالات بین‌المللی ISI درباره کشیدن دندان و دندانپزشکی اطفال و جراحی دندان

