

درد ایمپلنت دندان

ایمپلنت های دندان هنگامی مورد استفاده قرار می گیرند. که یک یا چند دندان از دست رفته باشد. در این مطلب به بررسی مقدار درد ایمپلنت دندان می پردازیم! ایمپلنت ها شبیه ترین نوع دندان مصنوعی به دندان های طبیعی هستند. ایمپلنت طی یک عمل جراحی در استخوان فک گذاشته و یا در واقع کاشته می شوند. این پایه ها به عنوان ریشه دندان مصنوعی می باشند. که حمایت از تاج دندان را به عهده دارند. این پایه با جوش خوردن به استخوان فک استحکام لازم را به وجود می آورد.

[مراحل درمان ایمپلنت چگونه است؟](#)

کاشت ایمپلنت

با کاشت ایمپلنت های دندان جویدن و گاز زدن مواد غذایی، صحبت کردن بهبود پیدا می کند. دندان ها کاملا شبیه دندان های طبیعی خواهد شد. ایمپلنت دندان مانند دیگر درمان های دندانپزشکی با درد همراه است. اینکه گفته می شود ایمپلنت دندان درد ندارد. کاملا اشتباه و غیر ممکن است مگر آنکه در بیهوشی انجام شود. درد بعد از ایمپلنت به فاکتور های متفاوتی بستگی دارد. که برای هر فردی با توجه به ویژگی های دندان و لثه متفاوت است. در زمان انجام ایمپلنت دندان شما بر اثر تزریق بی حسی ها احساس درد کمتری حس می شود. پس از انجام ایمپلنت دندان و تمام شدن اثر بی حسی ها درد ایمپلنت دندان بیشتر خواهد شد.

اینکه هر فردی از ایمپلنت و درد ایمپلنت ترس داشته باشد. کاملا طبیعی است. امروزه تکنولوژی و علم و فناوری در دندان پزشکی نیز نفوذ زیادی پیدا کرده است. که به وسیله کاهش دهنده درد و مسکن ها باعث کاهش درد می شود. طبق نظر سنجی از افرادی که با دندان درد، کشیدن دندان و ایمپلنت سر و کار داشته اند. به دست آمده است. کشیدن دندان به نسبت به ایمپلنت دندان درد بیشتری دارد.

با داشتن بیمه دندانپزشکی می توانید تعرفه دندانپزشکی درمانی و زیبایی خود را تا ۵۰٪ کاهش دهید...

درد و ناراحتی ناشی از بیماری های دندان برای هر فردی متفاوت است. ولی این اتفاق نظر در کمتر بودن درد ایمپلنت دندان نسبت به کشیدن دندان می تواند رضایت بخش باشد. ایمپلنت دندان درد دارد. ولی بهتر است بدانید که قبل از انجام این عمل از بی حسی استفاده می شود. و برای بعد از آن پزشک برای کاهش درد مسکن هایی را تجویز می کند که درد را تا حدود زیادی کم می کند.

ایا پیوند استخوان برای انجام ایمپلنت درد دارد؟

درد ایمپلنت هنگامی که عمل پیوند استخوان برای ایمپلنت باشد. بیشتر می شود. پیوند استخوان در پروسه ایمپلنت دندان برای افرادی که استخوان فک آنها ضعیف است انجام می شود. ضعیف بودن استخوان فک مانع از کاشت ایمپلنت می شود. معمولا بعضی از افراد نسبت به درد پیوند استخوان در ایمپلنت ترس بیشتری دارند. پیوند استخوان به روش های مختلفی انجام می شود. درد بعد از انجام این عمل نیز به روش انجام آن بستگی دارد.

[عوارض ایمپلنت دندان چیست؟](#)

[قیمت یک عدد پروتز دندان با داشتن کارت تخفیف دندانپزشکی مهرز چقدر است؟](#)

درد دندان بعد از انجام ایمپلنت چقدر طول می کشد؟

معمولا درباره میزان درد ایمپلنت و مدت زمان درد آن نمی توان زمان دقیقی را بیان کرد زیرا درد ایمپلنت دندان برای هر فردی فرق می کند. ممکن است فردی تا ده روز درد را بعد از ایمپلنت تجربه کند. ولی فردی دیگر نیز از این مورد

هیچگونه ناراحتی نداشته باشد. تمامی این تفاوت ها به موارد متفاوتی بستگی دارد. متورم شدن لثه بعد از ایمپلنت نیز با درد ایمپلنت به وجود می آید. این تورم معمولاً بعد از ۳ تا ۵ روز از بین می رود.

بعد از گذشت یک هفته احساس درد ایمپلنت دندان طبیعی است. و برای آرام شدن درد ناشی از ایمپلنت باید به طور مرتب با تجویز دندان پزشک از مسکن استفاده کرد. البته گاهی ممکن است که احساس درد تا ده یا ۱۵ روز بعد از جراحی ادامه داشته باشد.

بعد از گذشت دو هفته باید به میزان زیادی بهبود پیدا کرده باشد. ولی اگر بعد از دو هفته درد غیر قابل تحمل و زیادی دارید. حتماً به پزشک خود مراجعه کنید. تا در مراجعات بعدی از عدم عفونت و یا زخم ناشی از آن مطمئن شوید.

[تخفیف ایمپلنت | ایمپلنت با تخفیف با مهر از کارت](#)

[قیمت ایمپلنت دندان جلو فک بالا چقدر است؟](#)

دلایل احساس درد پس از ۳ الی ۴ ماه

- *کاهش خون رسانی به بافت های اطراف ایمپلنت
 - *ضعف سیستم ایمنی بدن
 - *پس زدن ایمپلنت
 - *تداخل دارویی با سایر داروهای مصرفی
 - *سلامت عمومی ضعیف بدن
 - *آسیب دیدن رشته های عصبی یا بافت
 - *وجود عفونت در قسمت زخم
 - *وارد شدن فشار زیاد به پایه ایمپلنت
 - *آلرژی به ایمپلنت
- ولی به یاد داشته باشید که برای هر نوع از درد ایمپلنت دندان بعد از گذشت سه تا چهار ماه نیاز است که به دندانپزشک خود مراجعه نمایید. تا علت ریشه یابی و درمان شود.

[هزینه دندانپزشکی | تعرفه دندانپزشکی](#)

[انواع روکش دندان برای ایمپلنت را بشناسید!](#)

دلایل احساس درد پس از ۱ سال

- *سیگار کشیدن
 - *دندان قروچه کردن
 - *کافی نبودن بافت لثه در ناحیه ایمپلنت
 - *عفونت کردن ناحیه زخم
 - *رادیوگرافی اطراف سر و گردن
 - *کافی نبودن استخوان فک
 - *عدم رعایت بهداشت دهان و دندان
- در این موارد توصیه می شود که به متخصص ایمپلنت مراجعه نمایید. که بعد از بررسی و یافتن علت دوره درمان آن شروع شود.

[ایمپلنت دندان | قیمت ایمپلنت دندان با کاهش هزینه مهر از کارت](#)

[ایمپلنت دندان با لیزر چگونه انجام میشود؟](#) [عوارض ایمپلنت دندان جلو چیست؟](#)

مراحل کاشت ایمپلنت دندان

- ۱- عکس برداری و اسکن داخل دهان به وسیله پرینتر سه بعدی و بررسی وضعیت ریشه و لثه
- ۲- جراحی و درمان ریشه و خالی کردن ریشه و عصب کشی و پاکسازی لثه
- ۳- استفاده از پیوند استخوان یا عمل پیوند لثه در صورت تشخیص متخصص به علت تحلیل رفتن استخوان لثه
- ۴- در صورت انتخاب شیوه ایمپلنت دیجیتال و انجام ایمپلنت فوری یک روزه دندان حفره کوچکی ایجاد میشود و پیچ ایمپلنت کار گذاشته می شود.
- ۵- در صورت نیاز به محکم کردن پیچ ایمپلنت از پودر استخوان طبیعی یا سنتزی بر اثر تشخیص پزشک استفاده می شود.
- ۶- پایه اباتمنت ایمپلنت روی پیچ کار گذاشته می شود.
- ۷- تاج دندانی سرامیکی پرسن یا کامپوزیتی روی پایه ایمپلنت تحویل داده می شود.

[روش جدید کاشت دندان بدون ایمپلنت چیست؟](#)

[ایمپلنت بعد از چند سال کشیدن دندان چگونه انجام میشود؟](#)

منابع: الهام گرفته از مجموعه مقالات بین المللی ISI درباره [ایمپلنت دندان](#)

