

کشیدن دندان شکسته در منزل

آیا کشیدن دندان شکسته در منزل ممکن است؟ کشیدن دندان در خانه چه عوارضی دارد؟ چه راه‌هایی برای کشیدن دندان در منزل می‌شناسید؟ در این مقاله قصد داریم به‌طور گسترده به موضوع کشیدن دندان شکسته در منزل بپردازیم برای پاسخ به سوالات و ابهامات خود تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

با تهیه [بیمه دندانپزشکی](#) می‌توانید [تعرفه دندانپزشکی](#) درمانی و زیبایی خود را تا ۵۰٪ کاهش دهید...

دلایل نیاز به کشیدن دندان

بعضی از دلایل رایج برای کشیدن دندان عبارتند از:

۱. پوسیدگی شدید: اگر پوسیدگی به لایه زیرین مینای دندان برسد، دندان قابل ترمیم نیست و باید کشیده شود.
۲. درد مزمن: اگر درد دندان ادامه دار باشد و با درمان‌های دیگر برطرف نشود، گزینه کشیدن دندان مطرح می‌شود.
۳. عفونت شدید: عفونت‌های شدید لثه که می‌توانند باعث آسیب به استخوان و بافت‌های اطراف دندان شوند.
۴. آسیب شدید به دندان: ضربه یا شکستگی شدید دندان ممکن است باعث آسیب غیرقابل برگشت به دندان و نیاز به کشیدن آن شود.
۵. ازدحام دندان‌ها: گاهی برای رفع ازدحام و جابجایی دندان‌ها، نیاز است تعدادی از دندان‌ها کشیده شوند.
۶. آماده‌سازی برای درمان‌های ارتودنسی یا جراحی: در برخی موارد، کشیدن یک یا چند دندان قبل از شروع درمان‌های ارتودنسی یا جراحی فک و صورت ضرورت دارد.
۷. دندان عقل: دندان عقل معمولاً دیرتر از بقیه دندان‌ها می‌روید و گاهی به دلیل فضای ناکافی، نیاز به کشیده شدن دارد.

آیا میدانید [کشیدن ریشه دندان عفونی](#) چقدر ضروری است؟

کشیدن دندان شکسته در منزل

متأسفانه، کشیدن یک دندان شکسته در منزل یک روش پرخطر است و توصیه نمی‌شود. کشیدن دندان به صورت حرفه‌ای و ایمن نیاز به تجهیزات و تخصص دارد که در محیط خانه فراهم نیست. اگر دندان شکسته دارید که نیاز به درمان دارد، بهترین راه حل این است که به یک دندانپزشک متخصص مراجعه کنید. دندانپزشکان تجهیزات و دانش لازم را برای انجام روش‌های ایمن و مؤثر در خارج کردن دندان شکسته دارند. آنها می‌توانند با استفاده از ابزارهای مناسب و با رعایت مسائل بهداشتی، دندان شکسته را از جا خارج کنند.

[کشیدن دندان](#) با کاهش هزینه ۵۰٪ تنها با کارت پزشکی مهراز!

کشیدن دندان لق شیری در منزل

هنگامی که کودکان حدود ۶ سالگی می‌رسند، دندان‌های شیری خود را از دست می‌دهند. اگر دندان شیری آویزان شده و در حال لق خوردن است، به کودک کمک کنید تا آن را بیرون بکشند. اگر کودک نتواند به تنهایی دندان شیری را بیرون بکشد، شما می‌توانید به او کمک کنید. ابتدا مقداری داروی ضد درد خوراکی را در اطراف دندان قرار دهید. این مسکن موضعی را می‌توانید از یک داروخانه به راحتی تهیه کنید و نیازی به نسخه پزشک ندارد. پس از استفاده از این دارو، چند دقیقه صبر کنید تا اثر آن بگذرد. اگر کودک احساس اضطراب دارد، می‌توانید مقداری مسکن به او بدهید تا آرامش یابد. یک گاز پانسمان یا دستمال کاغذی تمیز را بردارید و با استفاده از آن، دندان را به جلو و عقب تکان دهید تا ببینید آیا آماده کشیده شدن است یا خیر.

فرآیند کشیدن دندان ساده

بعد از بی حسی دندان، دندانپزشک از یک ابزار به نام الویتور استفاده می‌کند. این ابزار به طور دقیق درون بافت‌های اطراف دندان قرار می‌گیرد. الویتور با استفاده از لرزش‌های نرم و کنترل شده، بافت نگهدارنده دندان را متلاشی می‌کند. این کار باعث ایجاد حفره جای گیرنده دندان می‌شود و فضای لازم برای خروج دندان فراهم می‌گردد. پس از لق شدن دندان دندانپزشک با استفاده از انبر، دندان را به آرامی بیرون می‌کشد. این عمل با دقت و احتیاط صورت می‌گیرد تا به بافت‌های اطراف دندان آسیبی وارد نشود.

آشنایی با انواع جراحی دندان عقل...

فرآیند کشیدن دندان شکسته با جراحی

در برخی موارد، کشیدن دندان به روش ساده ممکن نیست و به جراحی نیاز دارد. در این حالت، دندانپزشک با استفاده از روش جراحی، دندان متضرر را بیرون می‌کشد. شما در شرایط زیر نیاز به جراحی دندان دارید:

- دندانی که کاملاً از لثه بیرون نمی‌آید.
- دندانی که بزرگتر است و به یکباره نمی‌توان آن را کشید و نیاز به خرد کردن آن است.
- دندانی که درون لثه قرار دارد و قابل دیدن نیست.
- دندانی که شکسته و از خط لثه پیشرفته است.

در این روش، دندانپزشک یک برش کوچک بر روی لثه ایجاد می‌کند تا به دندان مورد نظر بهتر دسترسی داشته باشد. سپس با استفاده از انبر، دندان را به جلو و عقب حرکت می‌دهد تا بخشی از دندان در استخوان فک شکسته شود و در نهایت دندان را بیرون می‌کشد. در بعضی موارد، دندانپزشک ممکن است لثه‌های لثه را با بخیه ببندد. برای کنترل خونریزی پس از کشیدن دندان، از گذاشتن گاز استریل در محل جراحی کمک بگیرید.

کشیدن دندان عقل به چه روش‌هایی امکان پذیر است؟

عوارض کشیدن دندان در خانه

کشیدن دندان در خانه بدون مشورت و دستورات یک دندانپزشک متخصص یا انجام آن توسط شخصی که تخصص لازم را ندارد، ممکن است به عوارض جدی و ناخواسته منجر شود. برخی از عوارض ممکن عبارتند از:

- ۱- عفونت: در هنگام کشیدن دندان، باز شدن لثه و ورود باکتری‌ها به داخل محل کشیدن دندان ممکن است عفونت را به همراه داشته باشد. این عفونت می‌تواند منجر به تورم، درد شدید، خونریزی و عوارض دیگر شود.
- ۲- تلفات ساختاری: در هنگام کشیدن دندان، اگر به طور نادرست فشار و نیروی زیادی به لثه و بافت‌های دور دندان وارد شود، ممکن است باعث تلفات و آسیب به بافت‌های اطراف و حتی استخوان فک شود.
- ۳- عوارض عصبی: در برخی موارد، دندان‌ها عصبی شده و با عصب‌های سوزنی در داخل دندان مرتبط هستند. در صورت نادرستی کشیدن دندان، ممکن است عصب‌های مجاور آسیب ببینند که منجر به درد، حساسیت و عوارض عصبی دیگر شود.

۴- بروز مشکلات فک و دهان: عمل کشیدن دندان نمی‌تواند به طور صحیح و هماهنگ در صورت نادرست انجام شود، ممکن است باعث تغییرات در تراز و موقعیت دندان‌های دیگر شود و مشکلات فک و دهانی مانند جابجایی دندان‌ها و بی‌تعادلی در دندان‌های باقیمانده را به همراه داشته باشد.

جراحی دندان نهفته چگونه انجام میشود؟

هزینه کشیدن دندان شکسته با کارت تخفیف دندانپزشکی چقدر است؟

نتیجه گیری

با توجه به مطالب ارائه شده، بهتر است هرگز در خانه اقدام به کشیدن دندان‌های شکسته یا پوسیده خود نکنید. بهترین راه حل برای جلوگیری از عوارض ناخواسته و مشکلات جدی این است که به دندانپزشک معتبر مراجعه کنید و درمان دندان را تحت نظر و راهنمایی او انجام دهید.

منابع: الهام گرفته از مجموعه مقالات بین المللی ISI درباره کشیدن دندان

