

کشیدن ریشه دندان عفونی

عفونت دندان یکی از شایع‌ترین مشکلات دندان‌پزشکی است که هزاران نفر را در سراسر جهان درگیر آن هستند. علاوه بر ایجاد درد و ناراحتی برای بیمار، می‌تواند عوارض جدی‌تری نیز به همراه داشته باشد. عفونت دندان می‌تواند باعث بروز بیماری‌های عمومی مانند عفونت‌های قلبی و عفونت‌های مختلف بدن شود. پس درمان درست و موقع عفونت دندان برای جلوگیری از گسترش آن بسیار حیاتی است. در این مقاله از مهراز کارت قصد داریم تا به بررسی روش‌های مختلف درمان عفونت دندان از جمله **کشیدن ریشه دندان عفونی**، عوارض احتمالی آن و نحوه مدیریت صحیح شرایط بیمار پس از کشیدن دندان بپردازیم، پس تا انتهای مطالب با ما همراه باشید.

با تهیه **بیمه دندانپزشکی** می‌توانید **تعرفه دندانپزشکی** درمانی و زیبایی خود را تا ۵۰٪ کاهش دهید...

منظور از عفونت دندان چیست؟!

آبسه دندان، یک وضعیت التهابی و آلودگی است که ناشی از عفونت باکتریایی در دهان به وجود می‌آید. این حالت معمولاً به دلیل حضور باکتری‌ها در نقاط مختلف دندان رخ می‌دهد و می‌تواند به علت عوامل متنوعی ایجاد شود. به طور خاص، دو نوع اصلی آبسه دندان وجود دارد: آبسه پریودنتال و آبسه پری‌اپیکال.

آبسه پریودنتال در ناحیه لثه و اطراف ریشه دندان ایجاد می‌شود. این نوع آبسه معمولاً نتیجه عفونت‌های باکتریایی است که در ناحیه پریودنتال، یعنی محیط اطراف دندان، ایجاد می‌شوند. اگرچه عفونت‌های پریودنتال قابل درمان هستند و دندانپزشکان می‌توانند با استفاده از روش‌های مناسب این آبسه را درمان کنند، اما در برخی موارد پیشرفت آبسه و عدم درمان موثر می‌تواند منجر به عوارض جدی شود.

در مورد آبسه پری‌اپیکال، این نوع آبسه معمولاً در انتهای ریشه دندان بروز می‌کند. علت اصلی بروز این آبسه ممکن است حفره درمان نشده در دندان، آسیب ریشه دندان یا کار دندانپزشک قبلی باشد. در برخی موارد، درمان با کانال ریشه ممکن است نتیجه‌بخش نباشد و دندان باید کشیده شود.

آشنایی با **انواع جراحی دندان عقل...**

نشانه‌های دندان عفونی

- درد تپنده دندان: این نوع درد به صورت تپشی و مستمر در دندان، استخوان فک، گوش یا گردن احساس می‌شود.
- حساسیت به فشار در دهان: دندان‌های عفونی معمولاً حساسیتی به فشار در دهان دارند، به طوری که حتی فشار کوچکی می‌تواند درد را تحریک کند.
- حساسیت به مواد غذایی و نوشیدنی‌های گرم و سرد: مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‌های خیلی گرم یا خیلی سرد می‌تواند درد بیشتری را در دندان‌های عفونی ایجاد کند.
- ورم گونه و غده‌های لنفاوی: در برخی موارد، عفونت دندان ممکن است منجر به ورم گونه (بخصوص در ناحیه دندان‌های عقل) و یا تورم غده‌های لنفاوی در ناحیه گردن شود.
- تب: در برخی موارد شدیدترین عفونت‌های دندان می‌تواند باعث افزایش دمای بدن و بروز تب شوند.
- بوی بد دهان و طعم نامطبوع: عفونت دندان می‌تواند باعث بوی بد دهان و حس یک طعم ناخوشایند در دهان شود، که نشانه‌های انتشار عفونت از دندان به سایر بخش‌های بدن می‌باشند.

هزینه کشیدن دندان شکسته با کارت تخفیف دندانپزشکی چقدر است؟

کشیدن ریشه دندان عفونی

وقتی عفونت به حدی شدید شود که دیگر راهی برای درمان دندان نباشد، دندانپزشک برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر عفونت و تخلیه آن، دندان عفونی را خارج می‌کند. پس از خارج کردن دندان، درمان بستگی به میزان گسترش عفونت دارد. اگر عفونت محدود به دندان خارج شده باشد، ممکن است نیازی به درمان با آنتی بیوتیک نباشد. اما در صورتی که عفونت به بافت‌های اطراف مانند دندان‌های مجاور یا فک گسترش یافته باشد، دندانپزشک برای کنترل بیشتر عفونت و جلوگیری از پیامدهای جدی، آنتی بیوتیک تجویز خواهد کرد. علاوه بر این، برای کاهش درد و التهاب، دندانپزشک ممکن است استفاده از آب نمک یا مسکن را توصیه کند. حفظ بهداشت دهان پس از عمل جراحی نیز بسیار ضروری است.

جراحی دندان نهفته چگونه انجام میشود؟

نحوه کشیدن دندان عفونی

نحوه کشیدن دندان عفونی شامل مراحل زیر است:

- ۱- بی‌حسی: در ابتدا، دندانپزشک با استفاده از مواد بی‌حس کننده، استخوان دندان و منطقه اطراف آن را بی‌حس می‌کند تا شما هیچگونه دردی احساس نکنید. این کار معمولاً با تزریق موضع عفونی انجام می‌شود.
- ۲- لقی کردن و شل کردن ریشه: سپس، دندانپزشک با استفاده از ابزارهای مخصوص، به لقی کردن و شل کردن ریشه دندان در حفره می‌پردازد. این عملیات با اعمال فشار و لرزش کوچک بر روی دندان انجام می‌شود تا آن را از بافت‌های اطراف جدا کند.
- ۳- جدا کردن دندان: پس از شل شدن ریشه، دندانپزشک با استفاده از ابزارهای مناسب، دندان را از محل خود جدا می‌کند.
- ۴- بخیه زدن: در نهایت، پس از کشیدن دندان، دندانپزشک محل مورد نظر را با دقت بخیه می‌زند.

نحوه کشیدن ریشه دندان عفونی

گاهی اوقات بخش بیرونی و به اصطلاح تاج دندان عفونی به دلیل آسیب پذیری بیشتر، شکستگی یا پوسیدگی از بین می‌رود در این شرایط کشیدن ریشه دندان عفونی به جراحی نیاز دارد. پزشک متخصص بعد از بی‌حسی بافت نرم دهان یعنی لثه را با ابزارهای مخصوص باز می‌کند و بعد از ضد عفونی کرد و حذف ریشه دندان آن را بخیه می‌زند.

هزینه کشیدن دندان عفونی

هزینه‌های مرتبط با کشیدن دندان عفونی ممکن است متفاوت باشد. در مقایسه با کشیدن دندان‌های پوسیده که عفونت ندارند، هزینه کشیدن دندان عفونی معمولاً بیشتر است. این امر به دلیل حساسیت بیشتر کشیدن دندان‌های عفونی است. عواملی مانند موقعیت دندان، شدت عفونت، استفاده از تجهیزات پیشرفته، تجربه دندانپزشک و نیاز به جایگزینی دندان‌های کشیده شده می‌توانند هزینه را تحت تاثیر قرار دهند. برای مشخص کردن هزینه دقیق، بهتر است توسط دندانپزشک معاینه شوید.

انواع **جراحی دندان** توسط متخصص و همچنین **کشیدن دندان** تنها با پرداخت نیمی از هزینه‌ها با کارت پزشکی مهراز

عوارض کشیدن ریشه دندان عفونی

کشیدن ریشه دندان عفونی معمولاً با عوارض ابتدایی مثل تب، درد و خونریزی همراه است ولی در شرایط بحرانی می‌تواند عوارض جدی مثل به وجود آمدن حفره خشک، احتمال باقی ماندن بخش‌های عفونی در لثه، خطر پخش شدن عفونت در دهان و احتمال پیشرفت عفونت به سمت سینوس‌ها داشته باشد.

مراقبت‌های بعد از کشیدن دندان عفونی

مراقبت از دهان پس از کشیدن ریشه دندان عفونی برای جلوگیری از بروز عوارض احتمالی بسیار مهم است:

- استفاده از مسکن‌های غیرقابل نسخه مانند ایبوپروفن برای کاهش درد.
- فشار دادن پانسمان اولیه تا ۴ ساعت و سپس شستشوی آرام دهان
- مصرف مایعات سرد و بستنی برای تسکین درد
- کاهش صحبت کردن برای ۴ ساعت اول
- استفاده از کمپرس یخ برای کاهش تورم
- اجتناب از فعالیت‌های سنگین
- استفاده از بالش بلند برای خواب
- شستشوی مرتب دهان با دهان‌شویه و ضدعفونی‌کننده

رعایت این موارد می‌تواند در بهبود سریعتر کمک کند.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب ذکر شده در این مقاله، کشیدن ریشه دندان عفونی یکی از راه‌های درمان آن است که پزشک فقط در شرایط بحرانی که دیگر حفظ دندان ممکن نیست از آن استفاده می‌کند. مراجعه به دندانپزشک متخصص و رعایت نکات بعد از کشیدن ریشه عفونی می‌تواند بروز عوارض درمان را به حداقل برساند.

منابع: الهام گرفته از مجموعه مقالات بین المللی ISI درباره [کشیدن دندان](#)

