

جراحی لته عفونی

لبخندی سالم با لته‌هایی عاری از عفونت سلامت دهان و دندان، کلید داشتن زندگی شاداب و سرشار از سلامتی است. در این میان، لته‌ها به عنوان نگینه‌ای پنهان، نقشی اساسی در حفظ و نگهداری دندان‌ها ایفا می‌کنند. اما گاهی اوقات، این نگینه‌ی ارزشمند به واسطه عفونت، دچار آسیب شده و نیازمند مراقبت‌های ویژه می‌شود. در این مقاله از مهراز کارت قصد داریم به بررسی جامع جراحی لته عفونی، علل، انواع، روش‌های انجام، مراقبت‌های بعد و سایر نکات مهم مرتبط با آن بپردازیم.

با تهیه **بیمه دندان پزشکی** می‌توانید **هزینه دندان پزشکی** درمانی و زیبایی خود را تا ۵۰٪ کاهش دهید...

لته عفونی چیست؟

لته عفونی، وضعیتی التهابی است که به واسطه تجمع باکتری‌ها در حاشیه لته و بین دندان‌ها به وجود می‌آید. این عفونت که به بیماری پریودنتال نیز معروف است، در صورت عدم درمان به موقع، می‌تواند به ساختارهای عمقی لته و استخوان فک نیز سرایت کرده و منجر به عواقب وخیمی مانند از دست دادن دندان‌ها شود.

علائم لته عفونی:

- خونریزی لته‌ها هنگام مسواک زدن یا نخ دندان کشیدن
- قرمزی، تورم و التهاب لته‌ها
- بوی بد دهان (هالیتوز)
- لق شدن دندان‌ها
- تحلیل رفتن لته و ایجاد فاصله بین لته و دندان
- درد و حساسیت لته‌ها
- عقب‌نشینی لته

جراحی لته را توسط متخصصین مهراز با ۵۰٪ کاهش هزینه انجام دهید!

انواع جراحی لته عفونی:

انتخاب نوع جراحی لته عفونی، به شدت بیماری و وضعیت لته‌ها بستگی دارد.

- جراحی فلپ: در این روش، جراح لته را به صورت یک فلپ بالا می‌زند، بافت عفونی و جرم را از بین می‌برد و سپس لته را در جای خود بخیه می‌زند. این روش برای درمان بیماری‌های لته در مراحل پیشرفته کاربرد دارد.
- جراحی پیوند لته: در مواردی که لته به واسطه عفونت یا تحلیل رفتن، دچار افتادگی شده باشد، از این روش برای بازسازی و تقویت لته استفاده می‌شود.
- جراحی لیزر: در این روش با استفاده از لیزر، بافت عفونی لته برداشته می‌شود. این روش کم‌تهاجمی‌تر و با خونریزی کمتری همراه است.

عوارض جراحی لته با عفونت:

همانطور که میدانید جراحی لته، که به عنوان پریودنتال نیز شناخته می‌شود، برای درمان بیماری‌های لته که به ساختارهای نگهدارنده دندان آسیب می‌رساند، انجام می‌شود. اگرچه این روش درمانی مزایای قابل توجهی برای سلامت دهان و دندان شما دارد، اما مانند هر عمل جراحی، با خطرات و عوارض جانبی بالقوه‌ای نیز همراه است. گاهی پزشک با توجه به میزان عفونت موجود در لته فرد می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا جراحی لته ممکن است یا خیر.

در صورت انجام جراحی لته ممکن است عوارض زیر پیش بیاید:

درد و ناراحتی:

درد و ناراحتی بعد از جراحی لثه طبیعی است و معمولاً با داروهای مسکن بدون نسخه قابل کنترل است.

تورم:

تورم لثه و بافت اطراف دهان بعد از جراحی شایع است و معمولاً طی چند روز تا چند هفته فروکش می‌کند.

خونریزی:

خونریزی جزئی بعد از جراحی لثه طبیعی است، به خصوص در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول. با این حال، خونریزی شدید یا مداوم باید به دندانپزشک شما گزارش شود.

عفونت:

عفونت یک عارضه جدی بعد از هر عمل جراحی است. علائم عفونت عبارتند از تب، لرز، تورم شدید، قرمزی، چرک و بوی بد دهان. در صورت مشاهده هر یک از این علائم، فوراً به دندانپزشک خود مراجعه کنید.

آسیب به اعصاب:

در موارد نادر، جراحی لثه می‌تواند به اعصاب دهان شما آسیب برساند که منجر به بی‌حسی یا درد در لثه‌ها، دندان‌ها یا لب‌ها می‌شود.

خشکی دهان:

خشکی دهان می‌تواند بعد از جراحی لثه به دلیل کاهش تولید بزاق ایجاد شود. این مشکل معمولاً موقتی است و با استفاده از آدامس یا آب دهان بدون قند قابل برطرف شدن است.

عوارض نادر جراحی لثه عفونی:

- واکنش‌های آلرژیک: واکنش‌های آلرژیک به داروهای بیهوشی یا سایر داروهای تجویز شده بعد از جراحی ممکن است رخ دهد. علائم واکنش آلرژیک شامل بثورات، خارش، تورم صورت یا تنگی نفس است.
- استخوان فک از دست رفته: در موارد شدید بیماری لثه، ممکن است در طول جراحی لثه مقداری از استخوان فک از بین برود.
- شل شدن دندان‌ها: جراحی لثه ممکن است باعث شل شدن دندان‌ها شود، به خصوص اگر بیماری لثه شدید باشد.

عوارض احتمالی جراحی لثه عفونی:

توجه کنید که این لیست کاملی از عوارض احتمالی جراحی لثه عفونی نیست.

خطر عوارض را می‌توان با انتخاب یک جراح دهان و دندان مجرب و رعایت دقیق دستورالعمل‌های مراقبت‌های بعد از عمل کاهش داد.

در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی بعد از جراحی لثه، فوراً با دندانپزشک خود تماس بگیرید.

علاوه بر عوارض ذکر شده در بالا، عفونت بعد از جراحی لثه می‌تواند عواقب جدی‌تری به همراه داشته باشد، از جمله:

- سرایت عفونت به سایر قسمت‌های بدن
- از دست دادن دندان
- آسیب دائمی به استخوان فک

برای کاهش خطر عفونت بعد از جراحی لثه، مهم است که دستورالعمل های مراقبت های بعد از عمل دندانپزشک خود را به دقت دنبال کنید. این دستورالعمل ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

- مصرف آنتی بیوتیک های تجویز شده
- استفاده از دهانشویه ضد عفونی کننده
- رعایت دقیق بهداشت دهان و دندان
- پرهیز از غذاهای سفت و جویدنی
- عدم استعمال دخانیات

در صورت مشاهده هرگونه علائم عفونت، مانند تب، لرز، تورم شدید، قرمزی، چرک یا بوی بد دهان، فوراً به دندانپزشک خود مراجعه کنید.

نکات مهم درباره جراحی لثه عفونی:

- در صورت مشاهده هرگونه علائم لثه عفونی، به دندانپزشک مراجعه کنید.
- تشخیص و درمان زودهنگام بیماری های لثه، از بروز عواقب وخیم آن جلوگیری می کند.
- رعایت بهداشت دهان و دندان به طور منظم، شامل مسواک زدن دو بار در روز، نخ دندان کشیدن و استفاده از دهانشویه، نقشی اساسی در پیشگیری از بیماری های لثه دارد.
- معاینات دوره ای دندانپزشکی، به تشخیص زودهنگام و درمان به موقع مشکلات دهان و دندان کمک می کند.

سخن پایانی:

سلامت لثه ها، ضامن سلامت دهان و دندان و به تبع آن، سلامتی کلی بدن است. با آگاهی از علائم لثه عفونی، مراجعه به موقع به دندانپزشک و انجام اقدامات درمانی لازم، می توان از بروز عواقب وخیم این بیماری جلوگیری کرد و لبخندی سالم و زیبا را برای همیشه به ارمغان آورد.

سوالات متداول

جراحی لثه عفونی برای چه کسانی لازم است؟

جراحی لثه ای که عفونت دارد برای افرادی که به بیماری های پیشرفته لثه مانند پریودنتیت شدید مبتلا هستند، تجویز می شود. همچنین، در مواردی که عفونت لثه به استخوان فک سرایت کرده باشد یا روش های درمانی دیگر موثر واقع نشده باشند، جراحی ضرورت پیدا می کند.

انواع جراحی لثه عفونی کدامند؟

رایج ترین انواع جراحی لثه با عفونت شامل جراحی فلپ، جراحی پیوند لثه و جراحی لیزر می باشد. انتخاب نوع جراحی به شدت بیماری و وضعیت لثه ها بستگی دارد.

جراحی لثه عفونی چقدر طول می کشد؟

مدت زمان جراحی لثه با عفونت، با توجه به نوع جراحی و پیچیدگی آن متفاوت است. به طور کلی، این جراحی بین ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت به طول می انجامد.

بعد از جراحی لثه عفونی چه مراقبت هایی باید انجام شود؟

مراقبت های بعد از جراحی لثه با عفونت شامل مصرف داروهای تجویز شده، استفاده از دهانشویه های ضد عفونی کننده، رعایت دقیق بهداشت دهان و دندان، پرهیز از مصرف غذاهای سفت و جویدنی، استفاده از کمپرس سرد برای کاهش تورم و درد، و عدم استعمال دخانیات می باشد.

عوارض جراحی لثه عفونی چیست؟

مانند هر عمل جراحی دیگری، جراحی لثه نیز می‌تواند با عوارضی همراه باشد. این عوارض شامل خونریزی، تورم، درد، عفونت و در موارد نادر، آسیب به اعصاب و دندان‌ها می‌باشد.

هزینه جراحی لثه عفونی چقدر است؟

هزینه جراحی لثه به عوامل مختلفی مانند نوع جراحی، محل زندگی، و دستمزد جراح بستگی دارد.

آیا جای بخیه بعد از جراحی لثه عفونی باقی می‌ماند؟

در جراحی فلپ، که رایج‌ترین نوع جراحی لثه است، بعد از التیام زخم، ممکن است جای بخیه به صورت خطوط نازکی روی لثه‌ها باقی بماند.

نکته: برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر در مورد جراحی لثه بیمار، حتماً با یک دندانپزشک یا متخصص پرپودنتال مشورت کنید.

بیمه دندانپزشکی

بیمه دندانپزشکی مهراز با کاهش هزینه ۵۰ درصدی به عموم مشتریان این اطمینان را به شما میدهد که بتوانید با کمترین هزینه، سلامت دندان‌های خود را تضمین کنید. همانطور که میدانید هزینه‌های مرتبط با خدمات دندانپزشکی در دسته گران‌ترین خدمات درمانی قرار می‌گیرد. از این رو داشتن یک **بیمه دندانپزشکی** جهت کاهش هزینه‌های این خدمات میتواند در این شرایط بسیار کمک‌کننده باشد. در نتیجه شما میتوانید با انتخاب یک بیمه دندانپزشکی مناسب هزینه‌های خود را به طرز قابل توجهی کاهش دهید.

بهترین کارت تخفیف دندانپزشکی

قطعا از مهمترین ویژگی‌هایی که میتوان برای یک کارت تخفیف دندانپزشکی نام برد، میزان پوشش دهی آن است که در این میان کارت تخفیف دندانپزشکی مهراز با پوشش ۵۰ درصدی به عنوان **بهترین کارت تخفیف دندانپزشکی** از سوی کاربران، شناخته شده است. از دیگر ویژگی‌های بهترین کارت تخفیف دندانپزشکی می‌توان به سرعت و سهولت در استفاده، پوشش وسیع خدمات دندانپزشکی و تخفیف‌های متنوع اشاره کرد. به علاوه مهراز کارت بدون پرداخت هزینه ماهانه و تنها با پرداخت یک هزینه سالانه بسیار جزئی ارائه می‌شود که از لحاظ مالی نیز برای شما بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

تخفیف کارت پزشکی و دندانپزشکی

شما میتوانید با دریافت **تخفیف کارت پزشکی و دندانپزشکی** تا ۵۰٪ در هزینه‌های درمانی و زیبایی دندانپزشکی خود صرفه‌جویی کرده و امکان استفاده از خدمات پزشکان و دندانپزشکان متخصص در سراسر کشور را داشته باشید. در نتیجه همه افرادی که نیاز به دریافت خدمات دندانپزشکی دارند میتوانند در رابطه با هزینه‌های گزاف دندانپزشکی و دریافت خدمات از پزشکان زبده اطمینان خاطر داشته باشند.

منابع: الهام گرفته از مجموعه مقالات بین‌المللی ISI درباره **جراحی لثه**